

## 聲線問題

兒童跟成人同樣有聲線問題，病徵如下：

- 說話長期聲音沙啞
- 經常失聲
- 說話聲線有別同齡及同性別兒童

## 兔唇及裂顎

若干兒童天生患有裂唇及 / 或裂顎，可影響進食及語言發展。醫生或會建議以手術修補裂唇。言語治療有助改善兒童進食能力及言語發展。

## 如何治療？

言語治療師會按問題性質建議不同方案，治療目的可包括強化口腔肌肉、指導正確發音、以遊戲促進言語發展或建議安全、有效的餵飼方法等。

# 物理醫學及復康科部 Department of Physical Medicine and Rehabilitation

查詢或預約，歡迎聯絡我們

## 物理醫學及復康科部 言語治療服務

香港跑馬地山村道二號  
養和醫院李樹培院五樓  
電話：2835 7156  
傳真：2892 7568  
電郵：pmrehab@hksh-hospital.com

### 辦公時間 (敬請預約)

星期一至星期五：上午九時至下午五時  
星期六：上午九時至下午一時  
星期日及公眾假期休息

[www.hksh-hospital.com](http://www.hksh-hospital.com)

© 香港養和醫院有限公司 版權所有

SPT102LHC-02-092016

# 兒童言語治療 服務



養和醫院  
Hong Kong Sanatorium & Hospital

物理醫學及復康科部  
Department of Physical Medicine  
and Rehabilitation

本院言語治療師可以為有言語問題的兒童提供評估及治療。合適的評估有助判斷兒童言語能力是否隨年齡而正常發展及有何不足，繼而提供度身訂造的治療方案，有效改善溝通能力。

## 常見兒童言語問題： 何時尋求言語治療師協助？

### 發音障礙

兒童一般會由淺至深、按階段掌握發音要訣，如屆若干年齡仍未能發出若干聲音組別或音節，則可能患有發音障礙。患者一般會：

- 發若干聲音或咬字不準
- 以另一個讀音代替，如以「豆」代「狗」
- 省卻若干音節，如將「葉」讀成「二」、「三」讀成「沙」
- 與該小童不太相熟的人士未能理解他/她的說話內容

### 發展性語言遲緩或障礙

個別兒童有理解及/或表達障礙，以致發展較同齡兒童遲緩。發展性語言問題可以是缺乏理想言語環境、整體發展遲緩、自閉性系列障礙、聽覺受損或腦部受創等因素所致，亦可以是原因不明。患者可能有以下病徵：

- 無法跟從指示
- 無法辨認物件及圖案
- 與別人交談時未能回應
- 無法組句
- 無法打開話匣子或與人延續話題

### 口吃

口吃一般始於兒時，或令患者終身說話有欠流暢，影響自信、學業、工作或社交生活，徵狀包括：

- 重複讀出部份或整個字詞，如「你…你…你好」
- 拖長發音，如「s----- 食咗」
- 說話夾雜無意思的字詞(填空詞)，如「要…*即係呢…eh…*個本書」
- 說話時面容扭曲或身體繃緊

### 讀寫障礙

部份兒童或有讀寫困難，無法將字形及發音跟字義串連起來。常見情況包括將英文字母「d」寫成「b」，或將中文字左右部份調轉來寫。

## 其他問題：言語治療如何協助？

除一般常見發展性言語問題外，兒童亦可能有餵飼、吞嚥及聲線等問題。

### 餵飼及吞嚥障礙

嬰兒及幼童或會因不同原因出現餵飼及吞嚥障礙。兒童吞嚥障礙的成因或屬先天，如出生時有兔唇及裂顎等缺陷，多為發育不健全或腦部受損所致。患者容易營養不良、脫水及食物吸入肺部(食物或飲料進入呼吸道)，徵狀如下：

- 吸吮困難
- 拒絕餵食
- 咀嚼困難
- 嚴重流涎
- 用餐時咳嗽或噎喉

