


使用眼藥水及眼藥膏的方法

1. 使用眼藥前，請先洗手。
2. 使用眼藥時，頭向後仰。
3. 用手指將下眼瞼向下輕拉，眼向上望：
眼藥水：滴1至2滴於下眼瞼穹窿內。(圖一)
眼藥膏：擠出2至3毫米及塗於下眼瞼穹窿內。(圖二)
4. 閉上眼睛，用紙巾拭去眼外多餘的藥水或藥膏，及以食指頭輕輕按壓內眼角約一分鐘。
5. 使用眼藥水或眼藥膏時，請勿讓瓶口接觸眼部。
6. 如使用兩種或以上的眼藥水，請相隔三至五分鐘。
7. 如同時使用眼藥水及眼藥膏，請先滴眼藥水，再塗眼藥膏。
8. 塗眼藥膏後，視力會出現短暫性模糊。
9. 使用眼藥後，請保持藥蓋緊閉及放置於陰涼處。避免陽光直接照射。



(圖一)



(圖二)

未開啟的眼藥水及眼藥膏均已消毒。藥瓶開封一個月後請勿使用，並應立即棄掉；或可參考藥廠的用藥指示。

養和醫院

香港跑馬地山村道2號李樹芬院4樓
電話：(852) 2835 8880；(852) 2835 8890
傳真：(852) 2892 7510
電郵：eye@hksh-hospital.com
服務時間
星期一至星期五：上午九時至下午五時
星期六：上午九時至下午一時
星期日及公眾假期休息
www.hksh-hospital.com

養和醫健專科中心

香港金鐘道88號太古廣場一座21樓
電話：(852) 2855 6700
傳真：(852) 2523 7660
電郵：eye@hksh-healthcare.com
服務時間
星期一至星期五：上午九時至下午五時
星期六：上午九時至下午一時
星期日及公眾假期休息
www.hksh-healthcare.com