

跑馬地

養和醫院

香港跑馬地山村道2號中院3樓

電話：(852) 2835 3750

傳真：(852) 2892 7432

neurosurgery@hksh-hospital.com

www.hksh-hospital.com

辦公時間

星期一至星期五：上午九時至下午五時

星期六：上午九時至下午一時

星期日及公眾假期休息

敬請預約

金鐘

養和醫健專科中心

香港金鐘道88號太古廣場一座22樓

電話：(852) 2855 6689

傳真：(852) 2892 7433

neurosurgery@hksh-healthcare.com

www.hksh-healthcare.com

敬請預約

慢性硬膜下血腫



查詢或預約，歡迎聯絡我們

慢性硬膜下血腫

腦膜位於頭顱骨與腦部之間，質地堅韌。腦硬膜下的空間稱為「硬膜下腔」，一旦積聚血水，會導致慢性硬膜下血腫，令腦部受壓。

慢性硬膜下血腫的成因頗為複雜，大多是頭部受創所致，令血液積聚於硬膜下腔。當身體嘗試吸收血塊時，會引起炎症反應，在血塊周邊形成微絲血管，一旦血塊變成液體，體積會增大，對腦部造成壓力。

由於致傷原因很多時都輕微，部份病人或記不起傷從何來。

慢性硬膜下積血較常見於年長人士，腦部會隨年齡萎縮，令血管懸空於硬膜下腔。長期酗酒人士的腦亦會同樣萎縮：頭部即使輕微受創，亦足以令硬膜下腔積血。如病人正服用抗血小板藥(如亞士匹靈)或薄血藥，出血風險亦較高。



症狀

由於血腫會慢慢積聚，早期病徵一般不太明顯，直至腦部受壓，引起四肢無力、言語不清、精神錯亂、頭痛或癲癇等症狀。

診斷

醫生會先作臨床評估，再透過腦部電腦掃描或磁力共振掃描確診。

治療

醫生會施行顱骨鑽孔術(Burr Holes Surgery)或顱骨切開術治療血腫，並減低其對腦部的壓力。手術大多在全身麻醉下進行，如有需要可作局部麻醉，手術風險一般不高。

預防

預防跌倒，尤其是長者，是防止慢性硬膜下血腫的重要措施。如頭部受創後持續出現頭痛或局部性神經功能缺損(如四肢無力或言語不清)，請立即求醫。此外，病人在術後初期應避免進行劇烈運動，以減低復發的機會。